



Kelt:

Kérdőív a vastagbéltükrözésre való felkészüléshez

Kérjük, hogy **kezelőorvosával együtt** gondosan válaszoljon minden kérdésre, és karikázza be az önre vonatkozó választ.

Az ön válaszai segítik a béltükrözést végző orvost abban, hogy az ön számára meghatározza a legmegfelelőbb és legbiztonságosabb kezelési módot.

1. Elsőfokú rokonnak (apa, anya, testvér, féltestvér, gyermek) 60 éves kora előtt vastag vagy végbél rákja volt. nem tudom igen nem
2. Első fokú rokonnak (apa, anya, testvér, féltestvér, gyermek) 60 éves kora után vastag vagy végbél rákja volt. nem tudom igen nem
3. Két vagy több másod fokú rokonnak vastag vagy végbél rákja volt. nem tudom igen nem
4. Volt már béltükrözésem. igen nem
Az utolsó béltükrözés dátuma:
Diagnózis:
5. Krónikus gyulladásos bélbetegséggel kezelnek.¹
Crohn betegség igen nem
Fekélyes vastagbélgyulladás (colitis ulcerosa) igen nem

¹ A betegnek, akit Chron betegséggel, ill. fekélyes vastagbélgyulladással (colitis ulcerosa) kezelnek, a béltükrözés előtt ki kell vizsgálatnia magát saját gastroenterológusánál, aki eldönti a béltükrözés szükségességét.

Választott orvosával együtt töltsse ki.

6. Antiaggregációs² vagy antikoaguláns (véralvadásgátló) gyógyszert szedek.

a) Nem.

b) Igen. Nevezze meg a gyógyszert/gyógyszereket: _____

A kiválasztott kezelőorvosával, vagy a kezelést elrendelő szakorvossal folytatott konzultációt követően a kezelést _____ nappal a beavatkozás előtt megszakítom.

Utolsó homosztázis-tesztek (fajta és érték): _____ lelet dátuma: _____

7. Vastartalmú gyógyszert szedek.

a) Nem.

b) Igen. A kezelést a beavatkozás előtt 7-10 nappal meg kell szakítani.

8. Cukorbetegség elleni gyógyszereket szedek (tabletta, inzulin).

a) Nem.

b) Igen. A kezelést a beavatkozás előtt a választott kezelőorvos, ill. diabetológus utasításai szerint kell alkalmazni.

9. Egészségi állapotom miatt az orvos utasításai alapján a béltükrözés előtt, alatt, és/vagy azt követően a következő gyógyszert/gyógyszereket kell szednem. Sorolja fel:

10. Egyéb, az egészségi állapotommal kapcsolatos tényezők, amelyek kihathatnak a béltükrözésre (pl. dialízis, krónikus obstruktív légúti betegség, májbetegségek, stb.):

A vizsgálandó személy klinikai státusza (az orvos jelöli meg)

Jelölje	Osztály	Egészségi állapot leírása
	ASA I	szervi, fiziológiai, pszichiátriai zavarok nélkül
	ASA II	rendezett krónikus betegséggel rendelkező beteg, erősebben nem kifejezett szisztematikus tünetekkel
	ASA III	erősebben kifejezett szisztematikus tünetek és időközönként állapotromlással rendelkező krónikus betegségű beteg
	ASA IV	rosszul rendezett krónikus betegséggel és gyakori, életveszélyes állapotromlással rendelkező beteg – a betegnél a béltükrözés az egészségi állapot stabilizálása után végzendő el

² Az endoszkópiát végző orvos a tervezett béltükrözés előtt bármikor elrendelheti az acetilszalicilsavas kezelés 5-7 napig tartó megszakítását, figyelembe véve a tromboembólia megnövekedett kockázatát a kezelés, és az acetilszalicilsavas gyógykezelés folytatásakor a vérzés kockázatát.