



Data:

Pyetësori i përgatitjes për kolonoskopi

Ju lutemi përgjigjuni të gjitha pyetjeve **me kujdes së bashku me mjekun tuaj të zgjedhur të kujdesit shëndetësor parësor** dhe rrethoni përgjigjen e duhur.

Për mjekun që do të kryejë kolonoskopinë do të jenë shumë të dobishme në përcaktimin e mjekimit më të mirë dhe që ekzaminimi të kryhet në mënyrë të sigurt dhe pa vonesa të panevojshme.

- Një i afërm i rrethit të ngushtë (babai, nëna, vëllai, motra, gjysmëvëllai, gjysmëmotra, djali, vajza) është sëmurë me kancerin e zorrës së trashë ose të rektumit në moshën nën 60-vjeçare. nuk e di po jo
- Një i afërm i rrethit të ngushtë (babai, nëna, vëllai, motra, gjysmëvëllai, gjysmëmotra, djali, vajza) është sëmurë me kancer të zorrës së trashë ose të rektumit në moshën mbi 60-vjeçare. nuk e di po jo
- Dy ose më shumë të afërm gjaku të rrethit të gjerë kanë kancer të zorrës së trashë ose të rektumit. nuk e di po jo
- Kam bënë kolonoskopi më parë.
Data e kolonoskopisë së fundit:
Diagnoza:
5. Mjekohem për sëmundje kronike inflamatore të zorrëve.¹
Sëmundja e Crohn-it po jo
Koliti ulceroz po jo

Plotësoni me mjekun tuaj të kujdesit shëndetësor parësor.

¹ Një pacient që mjekohet për sëmundjen e Crohn-it ose të kolitit ulceroz duhet të kryej një vizitë te gastroenterologu i tij para kolonoskopisë.

Ju lutemi ktheni fletën!

6. Jam duke u mjekuar me barna antiagregacionuese² ose antikoaguluese (barna kundër koagulimin të gjakut).

a) Jo.

b) Po. Ju lutemi specifikoni barin/barnat: _____

Pas këshillimit me mjekun e zgjedhur të kujdesit parësor ose me një mjek tjetër të specializuar i cili ka rekomanduar terapinë me bar, unë do të ndërpris përdorimin: _____ ditë para procedurës.

Analiza e hemostazës pas ndërprerjes së terapisë me varfarinë (lloji dhe vlera): _____

Data e analizës: _____

7. Mjekohem me preparate hekuri.

a) Jo.

b) Po. Terapia duhet të ndërpritet 7-10 ditë para procedurës.

8. Përdor barna për diabetin (tableta, insulinë).

a) Jo.

b) Po. Terapia duhet të përshtatet para procedurës sipas udhëzimeve të mjekut të zgjedhur të kujdesit parësor ose të diabetologut.

9. Kam të vendosur një defibrilator.

a) Jo.

b) Po.

10. Kam alergji të caktuara ndaj barit/barnave.

a) Jo.

b) Po. Ju lutemi specifikoni barin/barnat: _____

11. Sipas udhëzimeve të mjekut, për shkak të gjendjes sime mjekësore, para, gjatë dhe/ose pas kolonoskopisë, duhet të marr këtë bar/këto barna. Ju lutemi specifikoni barin/barnat:

12. Specifikime të tjera të gjendjes sime shëndetësore që mund të ndikojnë në kolonoskopinë (p.sh. dializa, sëmundjet pulmonare obstruktive kronike, sëmundjet e mëlçisë, elektrostimuluesi kardiak...):

Statusi klinik i të anketuarit/anketuarës (shënohet nga mjeku/mjekja)

Shënoni	Shkalla	Përshkrimi i gjendjes shëndetësore
	ASA I	pa çrregullime organike, fiziologjike, psikiatrike
	ASA II	pacient me sëmundje kronike të kontrolluar mirë, pa simptoma të rënda sistemike
	ASA III	pacient me sëmundje kronike me pasoja të theksuara sistemike dhe përkeqësime të herëpashershme
	ASA IV	pacient me sëmundje kronike të kontrolluar dobët, me përkeqësime të shpeshta të rrezikshme për jetën - kolonoskopia në këto raste duhet të kryhet pas stabilizimit të gjendjes shëndetësore

² Endoskopisti mundet gjithmonë, para kolonoskopisë së planifikuar, të vendosë një ndërprerje prej pesë deri në shtatë ditë të mjekimit me acid acetilsalicilik, duke pasur parasysh rrezikun e tromboembolizmit të ndërprerja e trajtimit dhe rrezikun e gjakderdhjes të vazhdimi i trajtimit me acid acetilsalicilik.